


Vil du være med til at undgå fejl med medicin?



STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

[Stps.dk/stoptaenktjek](https://stps.dk/stoptaenktjek)



#stoptaenktjek

pro.medicin

Pro.medicin.dk/stoptaenktjek

Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Insulin

Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.

Blodfortyndende medicin

Vær opmærksom ved operation - er noget ændret i behandlingen?
Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Digoxin

Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Gentamicin

Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.
Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.

Kalium

Vær opmærksom på, at oral opløsning ikke må gives i.v.
Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Methotrexat

Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis.
Overdosering kan være dødelig.

Opioider

Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.