

Ordinerer du patientsikkert?



Når du ordinerer medicin i dit lægepraksis-system eller FMK-online, kan du angive dosering på forskellige måder – nogle mere sikre end andre. Det er vigtigt, at doseringen er entydig og bliver overført korrekt til de lokale medicinsystemer, hvorfra plejepersonalet senere skal administrere lægemidlerne.

Det mest sikre er at anvende *doseringsforslag* eller *struktureret dosering*. Så bliver doseringen overført automatisk og skal ikke oversættes eller oprettes manuelt i de medicinsystemer, plejepersonalet bruger.

Vælger du at angive dosering *i fritekst*, skal personalet i kommunerne selv oprette doseringen i deres lokale medicinsystemer. Det giver risiko for, at der sker fejl ved den manuelle overførsel og dermed risiko for fejlmedicinering.

For at ordinere patientsikkert, skal du anvende:

1. **Doseringsforslag**
2. Hvis der ikke findes doseringsforslag, så anvend **struktureret dosering**

Vidste du..?

- at i 33 % af alle ordinationer er doseringen angivet som fritekst?
- at dosering skrevet i fritekst øger risikoen for medicineringsfejl?

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67 · 2300 København S
E-mail: stps@stps.dk · Tlf.: +45 7228 6600

www.stps.dk